

MEK-3DH

血液学质控品

HIGH 高值 2mL ASSAY SHEET 2mL 分析单

参数		区间	MEK -5103 -5105 -5204 -5207	MEK -5108 -5208	MEK-6108	MEK -5108 +QA -510V -5216	MEK -6108 +QA-610V	MEK-6318	MEK-8118
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±2.2							
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.25							
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7							
血细胞压积HCT	%	±4.0							
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0							
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.8							
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0							
血小板PLT	10 ³ /μL	±70							
平均血小板体积MPV	fL	±3.0							
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0							
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0							
单核细胞百分比MO%	%	±5.0							
粒细胞百分比GR%	%	±10.0							
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±1.8							
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.7							
粒细胞GR	10 ³ /μL	±2.0							
稀释液			ISOTONAC		ISOTONAC	ISOTONAC-3	ISOTONAC-3		
溶血素			HEMOLYNAC-2		HEMOLYNAC-3	HEMOLYNAC-2	HEMOLYNAC-3		

LOT No 批号	B268H
EXP.DATE 有效期	5-Nov-26
OPEN VIAL STABILITY 开瓶稳定期	14DAYS

参数		区间	MEK-6318	MEK-6400 -6410 -6420 -6450
			分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±2.2		20.5
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.25		5.87
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7		18.8
血细胞压积HCT	%	±4.0		53.9
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0		91.9
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.8		32.0
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0		34.9
血小板PLT	10 ³ /μL	±70		504
平均血小板体积MPV	fL	±3.0		5.2
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0		16.4
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0		15.1
单核细胞百分比MO%	%	±5.0		1.6
粒细胞百分比GR%	%	±10.0		83.3
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±1.8		3.1
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.7		0.3
粒细胞GR	10 ³ /μL	±2.0		17.1
稀释液			ISOTONAC-3	
溶血素			HEMOLYNAC-3N	

注意:

当用MEK-3DH做白细胞测定时，如果LY%,MO%,LY和MO值没有显示（该栏为空）。则设置白细胞灵敏度为“4”再重新测定。当测定人血标本时，一定要把白细胞灵敏度设为“5”。

*红细胞数是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

NIHON KOHDEN CORPORATION 日本光电工业株式会社

1-31-4 NISHIOCHIAI,SHINJUKU-KU TOKYO 161-8560 JAPAN

日本国东京都新宿区西落合1-31-4，邮编：161-8560

0694-901841E